BIOHUI®
博辉生物

核准日期：2007年06月29日
修订日期：2012年11月05日、2019年01月18日、2020年12月30日、2023年05月25日、2025年01月13日

人血白蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：本品为人血液制品，尽管经过筛检及灭活病毒处理，仍不能完全排除含有病毒等未知病原体引起传播[illegible]性疾病传播的可能。

【药品名称】
通用名称：人血白蛋白
英文名称：Human Albumin
汉语拼音：Renxue Baidanbai

【成份】
人血白蛋白，本品系由健康人血浆经过[illegible]分离纯化制备而成，[illegible]20%，[illegible]加入适量[illegible]作稳定剂，不含防腐剂和抗生素。

【性状】
本品为略黏稠、黄色或绿色至棕色澄明液体，不应出现[illegible]。

【适应症】
1.失血创伤、烧伤引起的休克。
2.脑水肿及损伤引起的颅[illegible]高。
3.肝硬化及肾病引起的水肿或腹水。
4.低蛋白血症的防治。
5.新生儿高胆红素血症。
6.用于心肺分流术、[illegible]时的[illegible]。

【规格】
10g/瓶（20%，50ml）

【用法用量】
用法：一般采用静脉滴注或静脉推注。为防止大量注射时机体组织脱水，可采用5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液适当稀释作静脉滴注（宜用备有滤网装置的输血器）。滴注速度应[illegible]，逐渐加速至正[illegible]。
用量：使用剂量由医师酌情考虑，一般因严重烧伤或失血等所致休克，可直接注射本品5～10g[illegible]；治疗肾病及肝硬化等慢性白蛋白缺乏症时，可每日注射本品5～10g，直至水肿消失，血清白蛋白含量恢复正常为止。

【不良反应】
上市后监测到人血白蛋白注射剂的下列不良反应/事件：
全身性疾病及给药部位[illegible]；
皮肤及皮下组织：皮疹、荨麻疹、斑丘疹、丘疹、红斑、水疱、脓疱、寒战、皮肤潮红、寒颤、血管性水肿；
呼吸系统、胸及纵隔：[illegible]；
胃肠系统：[illegible]；
免疫系统：超敏反应、类过敏反应、速发严重过敏反应、过敏性休克；
心脏器官：心悸、心动过速、心律失常、房颤、心动过缓、心力衰竭、心脏骤死；
神经系统：头晕、头痛、震颤、感觉减退、味觉障碍、嗜睡、昏迷、晕厥、意识丧失；
血管与淋巴管：潮红、发绀、苍白、四肢发冷、低血压、高血压、静脉炎；
精神类：烦躁不安、抽搐、精神障碍、意识模糊状态、失眠、惊厥；
肝胆系统：肝功能异常；
肾脏及泌尿系统：血尿、少尿、尿失禁、肾功能损害；


血液及淋巴系统:溶血症。
4.胃功能不全者。
【注意事项】
【药代动力学】
36个月
【执行标准】
【生产企业】
电话号码:0311-83935518
传真号码:0311-83935513